


野菜・花き・稲の害虫防除に

浸透移行型害虫防除剤 (フラニコチニル系)



アルバリン[®] 粒剤

有効成分：ジノテフラン…1.0%
毒性：- (毒劇物に該当しない)

®アグロ カネショウ(株)の登録商標



詳しい製品情報は
HPでご確認
いただけます。



新時代をひらく
期待の害虫防除剤。



決め手は浸透力

好評
発売中!

適用作物と使用方法

令和4年3月末現在

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ イネドクオイムシ イネミズゾウムシ カメムシ類	3kg/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	4回以内(育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)
きゅうり	ハモグリバエ類	2g/株	育苗期	1回	株元散布	4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
	コナジラミ類	1~2g/株				
	アブラムシ類	1g/株				
	ハモグリバエ類 アザミウマ類	2g/株	定植時		植穴土壌混和	
うり類(漬物用)	アザミウマ類	2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
	アブラムシ類 コナジラミ類	1~2g/株				
にがうり	コナジラミ類	2g/株	育苗期	1回	植穴土壌混和	3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)
メロン	ハモグリバエ類	2g/株				
	コナジラミ類	1~2g/株				
	アブラムシ類	1g/株				
	ハモグリバエ類 アザミウマ類	2g/株	定植時			
すいか	ワタアブラムシ	2g/株	育苗期	1回	植穴土壌混和	4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
			定植時			
			生育期但し、 収穫21日前まで		株元散布	

△ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- つまみ菜・間引き菜には使用しないでください。
- 蜜に対して影響があるので、周辺の蜜菜にはからないようにしてください。
- 株元散布を行う際は、処理直後に灌水してください。
- かんきつ及びなしに用いる場合は、今期に収穫見込のない苗木に対して株元散布し、処理後は軽く散水してください。なお、本剤を散布してから効果を発揮するまでにある程度の期間を要するため、対象害虫の発生前に予防的に散布してください。
- ふきに使用する場合には、葉に付着した薬剤は払い落とすしてください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ① ミツバチ等の巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
 - ② 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 水稲及びいぐさに使用する場合には、潜水状態(3cm程度)で田面に均一に散布し、4~5日間は潜水状態を保ち、散布後7日間は落水やかけ流しをしないでください。
- くわいに使用する場合には、田面に均一に散布し、散布後4~5日間は潜水状態を保ち、散布後7日間は落水やかけ流しをしないでください。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

△ 安全使用上の注意

- 街路、公園等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意してください。
- 魚毒性等・・・水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意してください。散布後は水管理に注意してください。

適用作物と使用方法

令和4年3月末現在

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シノフェランを含む農薬の総使用回数
かぼちゃ	アブラムシ類 コナジラミ類	2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内(定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)
ズッキーニ	アブラムシ類	1g/株	生育期但し、収穫開始14日前まで		株元散布	4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
なす	アブラムシ類	1g/株	育苗期	1回	株元散布	3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)
	ハモグリバエ類 コナジラミ類	2g/株 1~2g/株				
	アブラムシ類	1g/株	定植時	植穴土壌混和		
トマト ミニトマト	アブラムシ類	1g/株	生育期但し、収穫前日まで	2回以内	株元散布	5回以内(培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)
	ハモグリバエ類 コナジラミ類	1~2g/株	育苗期	1回	植穴土壌混和	
	アブラムシ類	1g/株	定植時		培土混和	
ピーマン	アブラムシ類	1~2g/株	生育期但し、収穫前日まで	2回以内	株元散布	3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)
	アザミウマ類	1~2g/株	定植時	植穴土壌混和		
とうがらし類	アブラムシ類	1g/株	生育期但し、収穫前日まで	2回以内	株元散布	4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
	アザミウマ類	1~2g/株	育苗期	1回	植穴土壌混和	
	アブラムシ類	1g/株	定植時		株元散布	
とうがらし(葉)	アザミウマ類 アブラムシ類	1g/株	生育期但し、収穫開始14日前まで	2回以内	植穴土壌混和	3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
キャベツ	アブラムシ類	2g/株	育苗期	1回	株元散布	3回以内(育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)
	アオムシ、コナガ	2~3g/株	定植時		植穴土壌混和	
	アブラムシ類	2g/株				
はくさい	アオムシ、コナガ	2~3g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内(定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布は2回以内)
	アブラムシ類	2g/株				
	ハイマダラノメイガ	3g/株				
ブロッコリー	アブラムシ類 コナガ	2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内(定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)
だいこん	アブラムシ類	6kg/10a	は種時	1回	播満土壌混和	5回以内(は種時の播満土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶剤の散布、液剤の散布及び無人航空機散布は合計2回以内)
	キスジノミハムシ	4~6kg/10a 9~12kg/10a			全面土壌混和	
	タネハエ	6kg/10a			散布	
チンゲンサイ	キスジノミハムシ	6kg/10a	生育期但し、収穫30日前まで	2回以内	土壌混和	3回以内(は種時及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)
非結球あぶらな科葉菜類 (チンゲンサイを除く) かぶ	アブラムシ類 キスジノミハムシ	6kg/10a	は種時	1回	播満土壌混和	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
レタス 非結球レタス	ナモグリバエ	培土1畝当り15g	は種前	1回	培土混和	4回以内(は種前の培土混和は1回以内、育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)
	アブラムシ類、ナモグリバエ	1g/株 2g/株	育苗期後半 定植時		株元散布 植穴土壌混和	
わけぎ	アザミウマ類 ハモグリバエ類	6kg/10a	生育期但し、収穫21日前まで	1回	株元散布	4回以内(定植後の株元散布は1回以内、生育期の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
ねぎ	クロバネキノコバエ類 アザミウマ類	6~9kg/10a	は種時 定植時	2回以内	播満土壌混和	4回以内(は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元散布は1回以内、散布、無人航空機散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)
	ハモグリバエ類	9kg/10a	は種時			
にんじん	ハモグリバエ類	9kg/10a	は種時	1回	播満土壌混和	4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、生育期の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
葉ごぼう	アブラムシ類	6kg/10a	生育期但し、収穫21日前まで	1回	全面土壌混和	2回以内(は種時の全面土壌混和は1回以内、生育期の株元散布は1回以内)
ほうれんそう	アブラムシ類	6kg/10a	は種時	1回	播満土壌混和	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
セルリー	アブラムシ類	2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
いちご	ワタアブラムシ	0.5~1g/株	定植時	1回	1回	1回
らっきょう	アザミウマ類	6kg/10a	生育期但し、収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
くわい	アブラムシ類	3kg/10a	収穫30日前まで			
オクラ	アブラムシ類	9kg/10a	生育期但し、収穫開始14日前まで	1回	株元散布	3回以内(株元散布は1回以内、散布は2回以内)
しょうが	クロバネキノコバエ類	9kg/10a	生育期但し、収穫14日前まで			
実えんどう さやえんどう さやいんげん	アブラムシ類	9kg/10a	生育期但し、 収穫開始14日前まで			
だいず えだまめ	フタスジヒメハムシ	6kg/10a	は種時	1回	播満土壌混和	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内)
しそ	マデイラコナカイガラムシ	2g/株(但し、10a当り25kgまで)	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
	アブラムシ類	1g/株(但し、10a当り30kgまで)				
食用ざく	マメハモグリバエ	2g/株(但し、10a当り30kgまで)	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
しゅんぎく	ハモグリバエ類	9kg/10a	は種時 定植時	1回	播満土壌混和 植満土壌混和	3回以内(は種時及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)
ふき	アブラムシ類	20kg/10a	定植後~生育期 (草丈20cm頃まで) 但し、収穫45日前まで	2回以内	土壌表面散布	3回以内(土壌表面散布は1回以内、散布は2回以内)
茶	クワシロカイガラムシ	12kg/10a	摘採7日前まで	2回以内	株元土壌混和	2回以内
かんざつ(苗木)	ミカンハモグリガ	20g/株	育苗期	5回以内	株元散布	5回以内
なし(苗木)	アブラムシ類	20g/株 (但し、10a当り110kgまで)	育苗期	1回	株元散布	1回
きく ガーベラ	マメハモグリバエ	2g/株(但し、10a当り30kgまで)	定植時	1回	植穴土壌混和	5回以内(土壌混和は1回以内)
	アブラムシ類、コナジラミ類	1g/株(但し、10a当り30kgまで)				
花き類・観葉植物 (きく、ガーベラを除く)	アブラムシ類	20kg/10a	生育期	5回以内	株元散布	5回以内(土壌混和は1回以内)
	コナジラミ類、アブラムシ類	1g/株(但し、10a当り30kgまで)	定植時	1回	植穴土壌混和	
つつじ類	アブラムシ類	20kg/10a	生育期	5回以内	株元散布	5回以内
さとうきび	ツツジゲンバイ	6kg/10a	発生初期	2回以内	散布	5回以内(粒剤は2回以内、液剤、水溶剤及び水和剤は合計3回以内)
	カンシャコバネナガカメムシ	6~9kg/10a	生育期但し、収穫45日前まで			
いくさ	メイチュウ類	9kg/10a	発生初期	2回以内	散布	2回以内
	イグサシモンシガ	3~6kg/10a				

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。