

ダニやアブラムシ類など 難防除害虫の対策に！

スカッシュ1,000倍加用



ダニへの付着効果



スリップスへの付着効果

果面汚れの比較写真

水和剤単独



スカッシュ加用



農林水産省登録 第19164号

kaO

機能性展着剤

スプレー・アジュバント

スカッシュ

スカッシュの特長

- 油溶性の食品添加物をベースに用いた、スプレー・アジュバント(機能性展着剤)です。特にハダニ、アブラムシ類、うどんこ病などの防除困難な病害虫に対し、殺虫剤・殺菌剤への加用で薬効を安定させます。
- 病害虫への付着効果が高まります
- 濡れ性がよく、乾きが早いので水和剤の汚れが軽減されます
- 作物残留を高めることはありません



【使用方法】

適用農薬名	作物名	散布液10ℓ当り使用量	使用方法
殺虫剤 ・ 殺菌剤	稲、麦類、雑穀類 野菜類、いも類 豆類(種実) 果樹類 花き類・観葉植物 てんさい	5~10ml	添加
	茶	10ml	
摘果剤(NAC剤)	りんご		
ジベレリン剤	温州みかん		

【試験成績】(参考例)

野菜：アザミウマ

試験場所：奈良県植物防疫協会

作物名：ナス(千両2号)

処理月日：1994年6月23日

調査月日：1994年6月26日

：1994年6月30日

試験区	補正密度指数	
	3日後	7日後
PAP乳剤 1,000倍 + スカッシュ 1,000倍	6.6%	9.4%
PAP乳剤 1,000倍	13.3%	17.4%
無散布区	100%	100%

【使用上の注意(抜粋)】

- 本剤を添加する適用農薬の使用方法を厳守するとともに、次のことに留意してください。
 - 適用農薬の使用上の注意事項に、薬害の生じやすい作物、気象条件などが記載されている場合には、本剤の使用をさけてください。
 - 作物の幼苗期、高温時など一般に薬害の生じやすい条件では、本剤の使用をさけてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

【その他、使用上のポイント】

- キノン系、キノキサリン系、ストロビルリン系、アニリド系薬剤に添加すると薬害を生じるおそれがあるので十分注意し、使用に当たっては事前にその適否を確認してください。病害虫防除所等関係機関の指導がある場合にはそれに従ってください。

使用の際はラベルをよく読み正しくお使い下さい。

※保管上の注意

本剤は低温(10℃以下)で放置された場合、一部白濁沈殿を生じる場合があるので、使用の際にはあらかじめ透明液体にもどしてから(10℃以上においておくか、温湯を用いて溶かす)使用してください。なお、一部白濁沈殿が生じた場合でも本剤の品質には問題はありませぬ。

包装：500ml×20

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

お求めは・・・

■販売



丸和バイオケミカル株式会社

- 本社/〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2
TEL03-5296-2314
- 札幌/TEL011-222-1285 ■仙台/TEL022-261-1103
- 名古屋/TEL052-951-7234 ■大阪/TEL06-6484-6850
- 福岡/TEL092-714-7101

<https://www.mbc-g.co.jp>

お問い合わせ窓口/TEL 03-5962-9731 (9時~17時 土日祝を除く)

■製造

花王株式会社 KAO