



syngenta.

シンジェンタ ジャパン株式会社 [ホームページ] www.syngenta.co.jp

オンシツコナジラミ

- ▶汁を吸わせず餓死させる、ユニークな吸汁阻害作用。
- ●果菜類を加害するコナジラミ類・アブラムシ類に高い殺虫効果。
- ●ハチ・天敵への影響が少なく、安心して使用できます。
- ●浸透移行性が高く、作物のすみずみまで行きわたり、 新葉や下葉の虫も確実に防除できます。
- ●粉立ちがなく、計算しやすい顆粒水和剤になって、 さらに扱いやすくなりました。





タバココナジラミ

ワタアブラムシ

チェス顆粒水和剤の薬量とタンクの大きさ

※チェス顆粒水和剤を「5000倍」希釈でご使用になる場合は、以下の早見表をご参考下さい。 ※「オクラ」および「ばれいしょの250/10a散布」は希釈倍数がそれぞれ「6000倍」、「1000倍」です。 以下の早見表はご使用になれませんのでご注意ください。

希釈液量(タンクの大きさ)	20 l	50 l	100 l	200 l	500 l	1000 l	2000 l	
薬量(g)	4	10	20	40	100	200	400	

適用病害虫の範囲及び使用方法

商用 四川州台出の戦団及び使用力法										
適用 拡大 作物名	適用病害虫名	人 希釈倍数 人	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピメトロジンを含む農薬 の総使用回数			
もも なし		5000倍	200 ~ 700 l /10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内			
うめ				収穫 21日前まで						
うり類 (漬け物用			100 ~ 300 l /10a	収穫前日まで						
にがうり				収穫開始3日前まで	3回以内		3回以内			
みょうが(花穂)	アブラムシ類			収穫前日まで - -	3回以内	散穂に では では では では では では では では では では	3回以内			
ズッキーニ					2回以内	散布	3回以内(定植時の株元散布は 1回以内、散布は2回以内)			
ピーマン とうがらし類					3回以内		4回以内(育苗期の株元散布は 1回以内、散布は3回以内)			
メロン					4回以内		4回以内			
すいか				収穫3日前まで			5回以内(育苗期の株元散布は 1回以内、散布は4回以内)			
ばれいしょ		1000 倍		収穫14日前まで	3回以内		3回以内			
オクラ		6000 倍	100 ~ 300 l /10a	収穫前日まで						
トマト ミニトマト きゅうり	コナジラミ類 アブラムシ類 コナジラミ類	5000倍					4回以内 (育苗期の株元散布及び 定植時の植穴処理は 合計1回以内、散布は3回以内)			
なす							4回以内(育苗期の株元散布は 1回以内、散布は3回以内)			
いちご							3回以内			
花き類・観葉植物				発生初期	4回以内		4回以内			

■使用上の注意事項

- ① 野菜のコナジラミ類に使用する場合は、成虫の少ない発生初期に散布してください。 ②散布量は対象作物の生育段階、栽培形態、散布器具及び散布方法に合わせて 調節してください。
- ③ 散布液は調製した日に使いきってください。
- ④ きくでは品種・栽培条件によっては薬害を生じる恐れがあるので、あらかじめ安全 性を確かめてから使用してください。
- ⑤ 本剤をばれいしょに対して希釈倍数1000倍で散布する場合は、少量散布に適合した ノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用してください。
- ⑥ 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にかからないようにしてください。
- ⑦本剤の散布液を調製した容器ならびに散布器具は使用後十分に水で洗浄して ください。また、洗浄した廃液ならびにやむを得ず使い残した散布液は、河川など に影響がないように適切に処理してください。
- ⑧ 使用後の空容器は、放置せずに環境に影響のないよう適切に処理してください
- ⑨ 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に 初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- ⑩適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用 者の責任において事前に薬害の有無を十分に確認してから使用してください ① 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。
- 眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- ② 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してくだ さい。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- ③ 直射日光をさけ食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管 してください。
- ●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。
- ●使用後の空袋は、放置せずに環境に影響のないよう適切に処理してください。

シンジェンタ ジャパン株式会社

〒104-6021 東京都中央区晴海1-8-10 オフィスタワーX 21階 [ウェブサイト] www.syngenta.co.jp

