

脱皮阻害型殺虫剤

カステード[®]乳剤

©=BASF社の登録商標



特長

1. チョウ目、アザミウマ目、ダニ目、カメムシ目、ハエ目など幅広い害虫に効果!
2. 適用作物が広い。100種類以上の作物に使用可能!
3. 優れた残効性
4. 天敵類に影響が少ない
5. EU/台湾向けのお茶・りんごにも使用可能!



■適用害虫と使用方法 (色文字が2022年10月以降の適用拡大部分)

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	使用回数
りんご	ナミハダニ リンゴハダニ	2000	200~700ℓ /10a	収穫14日前まで	2回以内
	キンモンホソガ ギンモンハモグリガ	2000~4000			
	ハマキムシ類	2000~6000			
	ヨモギエダシャク	4000			
なし	ハダニ類 ハマキムシ類	2000			
	ハダニ類 ハマキムシ類	4000			
もも	ハダニ類	2000			
	ハダニ類 ハマキムシ類	4000			
ネクタリン	ハダニ類	2000			
	ハダニ類 ハマキムシ類	4000			
小粒核果類	ハダニ類	2000			
	ハダニ類 ハマキムシ類	4000			
おうとう	ハダニ類	2000			
	ハダニ類 ハマキムシ類	4000			
かんきつ	ハダニ類	2000			
	ハダニ類 ハマキムシ類	4000			
	ハダニ類 ハマキムシ類	4000			
かき	ハダニ類	2000			
	ハダニ類 ハマキムシ類	4000			
マンゴー	ハダニ類	2000			
ぶどう	ハダニ類	4000			
キャベツ	ハダニ類	2000~4000			
	ハダニ類	16~24*1			
	ハダニ類	32*1			
	ハダニ類	32*1			
はくさい	ハダニ類	2000~4000			
	ハダニ類	16~24*1			
	ハダニ類	32*1			
だいごん	ハダニ類	2000~4000			
	ハダニ類	16~24*1			
	ハダニ類	32*1			
はつかだいごん	ハダニ類	4000			
わさびだいごん	ハダニ類	2000~4000			
非結球あぶらな科葉菜類 (なばな類を除く)	ハダニ類	2000			

■使用方法: 散布

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	使用回数
なばな類	ハダニ類	2000~4000	100~300ℓ /10a	収穫21日前まで	3回以内
	ハダニ類	4000			
ブロッコリー	ハダニ類	32*1	1.6ℓ /10a*1	収穫7日前まで	2回以内
	ハダニ類	64*1			
	ハダニ類	64*1			
レタス 非結球レタス くきしや	ハダニ類	4000	100~300ℓ /10a	収穫3日前まで	3回以内
	ハダニ類	4000			
トマト	ハダニ類	2000~4000	100~300ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内
	ハダニ類	2000			
	ハダニ類	2000			
ミニトマト	ハダニ類	4000	100~300ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内
	ハダニ類	2000~4000			
	ハダニ類	2000			
なす	ハダニ類	2000~4000	100~300ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内
	ハダニ類	2000~4000			
	ハダニ類	2000~4000			
ピーマン	ハダニ類	4000	100~300ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内
	ハダニ類	2000			
ししとう	ハダニ類	2000	100~300ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内
甘長とうがらし	ハダニ類	4000			
せり科葉菜類 (みつば、パセリ、セルリーを除く) ゆきのした ふだんそう モロヘイヤ 食用なでしこ 食用ペンタス	ハダニ類	4000	100~300ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内
	ハダニ類	4000			
	ハダニ類	4000			
パセリ	ハダニ類	4000	100~300ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内
セルリー	ハダニ類	4000			
みつば	ハダニ類	2000	100~300ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内
ねぎ	ハダニ類	4000			
ねぎ	ハダニ類	32*1	1.6ℓ /10a*1	収穫14日前まで	3回以内
	ハダニ類	64*1			
	ハダニ類	64*1			
いちご	ハダニ類	4000	100~300ℓ /10a	収穫前日まで	4回以内
	ハダニ類	4000			
きゅうり	ハダニ類	2000~4000	100~300ℓ /10a	収穫前日まで	4回以内
	ハダニ類	2000			

*1 使用方法: 無人航空機による散布

裏面へ続く▶

■適用害虫と使用方法 (色文字2022年10月以降の適用拡大部分)

■使用方法:散布

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	使用回数	
すいか	ミナミキイロアザミウマ オオタバコガ マメハモグリバエ	2000~4000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	4回以内	
	シロイチモジヨトウ	4000				
メロン	ミナミキイロアザミウマ	2000~4000	2000	収穫7日前まで	3回以内	
	タバココナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミを含む) トマトハモグリバエ	2000				
かぼちゃ	トマトハモグリバエ	16*1	0.8ℓ/10a*1	収穫前日まで	3回以内	
		16~32*1	1.6ℓ/10a*1			
		32~64*1	3.2ℓ/10a*1			
うり類(漬物用) (しろうり、とうがんを除く)	ミナミキイロアザミウマ	2000	100~300ℓ/10a	収穫3日前まで	1回	
しろうり	ウリノメイガ ミナミキイロアザミウマ			収穫前日まで		
とうがん	ミナミキイロアザミウマ			収穫3日前まで		
にがり	マメハモグリバエ ウリノメイガ アザミウマ類	2000~4000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	4回以内	
ズッキーニ	トマトハモグリバエ	2000		収穫前日まで	3回以内	
未成熟 とうもろこし	ツマジロサヨトウ アウノメイガ オオタバコガ	2000~4000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	
	ヨトウムシ	2000~4000		収穫前日まで	4回以内	
てんさい	シロオビノメイガ テンサイモグリハナバエ カメノコハムシ ナミハダニ アシクロハモグリバエ	4000	25ℓ/10a	収穫7日前まで	4回以内	
	ヨトウムシ	1000				
	ヨトウムシ シロオビノメイガ テンサイモグリハナバエ カメノコハムシ ナミハダニ アシクロハモグリバエ	32~64*1				1.6ℓ/10a*1
	ヨトウムシ	1000				
アスパラガス	ハスモンヨトウ オオタバコガ アザミウマ類	4000	100~500ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	
しゅんぎく	マメハモグリバエ アザミウマ類 ハスモンヨトウ ヨトウムシ	2000~4000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	
ほうれんそう	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ シロオビノメイガ ホウレンソウケナガコナダニ アシクロハモグリバエ	4000		収穫3日前まで	3回以内	
そらまめ 未成熟そらまめ	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ	2000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	
さやしんげん	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ	4000 2000				
さやえんどう 実えんどう	シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ	4000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	
未成熟ささげ つるむらさき	ハスモンヨトウ			3000		

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	使用回数
えだまめ	ハスモンヨトウ ウコンノメイガ カメムシ類	4000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内
だいず	ハスモンヨトウ ウコンノメイガ カメムシ類 ハダニ類 マメシクイガ フタスジヒメハムシ ダイズサヤタマバエ ツメクサガ			32*1	
あずき	アズキノメイガ ハスモンヨトウ ハダニ類	4000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内
		16~32*1	0.8ℓ/10a*1		
		32~64*1	1.6ℓ/10a*1		
オクラ	オオタバコガ ハスモンヨトウ	2000~4000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内
みょうが(莖葉)	ハスモンヨトウ ハダニ類	2000		みょうが(花穂)の 収穫前日まで 但し、花穂を収穫し ない場合にあつては 開花期終了まで	
みょうが(花穂)*2	ハスモンヨトウ	4000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内
しそ(花穂) しそ科葉菜類 (バジルを除く) タラゴン 食用トレニア	ハスモンヨトウ				
バジル	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ	4000	100~300ℓ/10a	収穫3日前まで	3回以内
にんじん	ヨトウムシ クロバネキノコバエ類				
たまねぎ	ネギアザミウマ ネギハモグリバエ	4000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内
にら	アザミウマ類				
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ	16~32*1	0.8ℓ/10a*1	収穫7日前まで	2回以内
食用ミニバラ	ミカンキイロアザミウマ	32~64*1	1.6ℓ/10a*1		
きく(葉)	アザミウマ類 ハスモンヨトウ	2000	100~300ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内
食用きく	マメハモグリバエ ミカンキイロアザミウマ	4000	100~300ℓ/10a	収穫14日前まで	
食用さくら(葉)	アザミウマ類	2000	200~700ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内
茶	チャノコカクモンハマキ チャノホンガ チャノミドリヒメヨコバイ チャハマキ ヨモギエダシヤク チャノキイロアザミウマ チャノホコリダニ チャノナガサビダニ ツマグロアオカスミカメ チャトゲコナジラミ	4000	200~400ℓ/10a	摘採7日前まで	2回以内
さつき	ツツジグンバイ チュウレンジバチ	2000	100~300ℓ/10a	発生初期	3回以内
きく ガーベラ	マメハモグリバエ ミカンキイロアザミウマ				
ぼら	ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ	1000 2000	100~300ℓ/10a	発生初期	3回以内
宿根かすみそう	シロイチモジヨトウ				
スターチス	ハスモンヨトウ	2000	100~300ℓ/10a	発生初期	3回以内
ソリダゴ	シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ				
宿根アスター	シロイチモジヨトウ	2000	100~300ℓ/10a	発生初期	3回以内
はばたん	コナガ				
けいとう	シロオビノメイガ	2000	100~300ℓ/10a	発生初期	3回以内
カーネーション	タバコガ				
ほおすき	タバコガ	4000	100~700ℓ/10a	発生初期	3回以内
りんどう	リンドウホンハマキ				

*1 使用方法:無人航空機による散布

*2 みょうが(花穂)の使用方法:散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により
散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空容器は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。●防除日誌を記帳しましょう。

BASFジャパン株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL日本橋ビル3階 ☎0120-014-660
https://crop-protection.basf.co.jp/



詳細はWEBでも
ご覧いただけます。